

令和5年3月15日

麦作情報 第5号

J A む な か た
北筑前普及指導センター

◎気象概況

本年の麦の生育は、全体的に平年より進んでいます。そのため、出穂期は平年より早くなる見込みです。

今後は、穂揃期追肥や赤かび病防除など麦の品質を大きく左右する重要な管理作業があります。本年は播種時期やほ場の排水性の違いにより、生育が大きく異なっている為、生育に応じた適期作業、適期防除に努めてください。

1. 排水対策

出穂期以降の降雨は麦の登熟に大きく影響するため、排水対策は極めて重要です。もう一度排水溝の溝さらえや排水溝の連結等を行い、地表面や溝に水が溜まらないようにしましょう。

2. 施肥（小麦）

小麦では、タンパク質含有率が基準値の範囲内になるよう、必ず早めに穂揃期追肥を行って下さい。追肥一発肥料のグッドIB506を施用されているチクゴイズミのほ場でも、葉色が薄いほ場や莖数(穂数)が多いほ場では穂揃期追肥（硫安 5kg/10a）を行いましょう。

なお、穂揃期追肥を行っても熟期が大幅に遅れることや倒伏することはありません。

<粒状施肥の場合>

品 種	施 肥 時 期（予想）	施 肥 量
チクゴイズミ (タンパク質含有率) 目標 10%	穂揃期～穂揃期後7日まで 1 1月20日頃播種の目安 (4/5～4/12日頃) 1 2月5日頃播種の目安 (4/12～19日頃)	硫安 10kg/10a 又は 尿素 5kg/10a
ちくしW2号 (タンパク質含有率) 目標 12%	<u>※津屋崎地区はこれより10～14日程度早まる可能性があります。</u>	硫安 25kg/10a 又は 尿素 11kg/10a

※葉色が薄いほ場や莖数が多いほ場では、施用量を増やしてください。

(+5kg/10a程度)

※播種が遅れたほ場でも必ず施用してください。

(参考) 出穂期：全莖数の40～50%が出穂した日

穂揃期：全莖数の80%以上が出穂した日（出穂期の2～4日後）

※出穂とは止葉の葉鞘から穂先（芒「ボウ」は含まない）が現れたことをいう。

＜尿素の葉面散布の場合＞

品 種	施 肥 時 期	施 肥 量
チクゴイズミ	赤かび病防除と同時散布 (1回)	尿素 5kg/10a
ちくしW2号	赤かび病防除と同時散布 (2回)	尿素 5kg/10a×2回

注1) 高温時(25℃以上)に葉面散布を行うと葉焼け程度が激しくなる場合があるので、散布は涼しい時間帯に行い、展着剤は使用しないでください。

注2) 散布器具が故障しないように、散布後は器具を良く洗いましょう。


3. 赤かび病対策

麦種	1回目の防除	2回目防除(1回目の7日後)	
大麦	^{キクガラ} 葯殻抽出始め頃 (出穂期から 12~14日後頃)	<u>ワークアップフロアブル</u> 2,000~3,000倍 60~150ℓ/10a 散布	<u>ワークアップフロアブル</u> 2,000~3,000倍 60~150ℓ/10a 散布
小麦	開 花 期 (出穂期から 7~10日後頃)	(1回目は2,000倍 を推奨します。)	2,000~3,000倍 60~150ℓ/10a 散布


開花(受粉)直後



葯殻抽出始め



葯殻抽出完了



発病(葯殻抽出時接種)



★ 出穂期と防除時期の予測 (11月20日頃播種の場合)

麦種名	品 種	出穂期(予想)	1回目防除時期(予想)
大麦	はるさやか	3/25~27日頃	4/6~10日頃
小麦	チクゴイズミ ちくしW2号	4/3~5日頃	4/10~15日頃

※津屋崎地区は上記予想より10~14日程度早まる可能性があります。

必ず、各ほ場の出穂期を確認してから防除計画を立て適期防除に努めて下さい。