

令和 6 年 4 月 末 日

## 麦作情報 号外

J A む な か た  
北筑前普及指導センター

現在、福岡県に赤かび病の注意報が出ています。

気象台の 1 ヶ月予報でも気温が高く、降水量も平年並みから多いと予想されているため、今後、赤かび病の感染拡大が懸念されます。

福岡県下および管内でも発生が確認されており、今後、赤かび病の感染拡大を防ぐために、2回目の防除をしていない方は、右側の表を参考に収穫前日数等を確認の上、早急に防除をしてください。

また、2回防除を行った方でも、圃場を確認していただき、多発している場合は防除をしてください。

【注意】※今後、防除薬剤を購入される方へ

福岡県下でこのような状況のため、在庫がかなり品薄になっています。

品物によっては取り寄せも出来ない物もありますので、購入を予定されている方は、右側の表を参考にアドバイザーまたはグリーンセンターに相談してください。



薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数
ワークアップ フロアブル	2000～ 3000 倍	収穫 7 日前まで	3 回以内
シルバキュア フロアブル	2000 倍	小麦：収穫 7 日前まで 大麦：収穫 14 日前まで	2 回以内
トップジン M 水和剤	1000～ 1500 倍	小麦：収穫 14 日前まで 大麦：収穫 30 日前まで (大麦使用不可)	小麦：3 回以内 (但し出穂期以降は 2 回以内) 大麦：3 回以内 (但し出穂期以降は 1 回以内) (大麦使用不可)
チルト乳剤 25	1000～ 2000 倍	小麦：収穫 3 日前まで 大麦：収穫 21 日前まで (大麦使用不可)	小麦：3 回以内 大麦：1 回 (大麦使用不可)

※トップジン M 水和剤及びチルト乳剤 25 は、登録内容が使用時期外になるため大麦には  
使用しないでください。

※ワークアップフロアブルの在庫が無い場合は、シルバキュアフロアブル、トップジン M 水和剤、チルト乳剤 25 のいずれかを使用してください。