



収穫 収穫適期は、7割程度の籾が黄化し、穂首に近い籾はわずかに緑が残っている時期。
水管理 収穫1週間前までは、間断かん水又は飽水管理を続ける。早い時期の落水は、登熟不良・品質低下を招く。台風襲来時は、茎葉からの蒸散が大きいので、深水とする。

病虫害防除 箱施薬 スクラム箱粒剤 50g/箱 ウンカ類ニゴノメイガ 防人箱粒剤 50g/箱 ウンカ類ニゴノメイガイネシムシノミ 液剤体系 ノンラフロアブル 1000倍 エクトフロアブル 2000倍 粒剤体系 コラトフ豆つぶ 250g

土づくり 家畜ふん尿処理物の利用 基肥に牛ふんの発酵処理物を使用する場合、10a当たり1~2トンを春先までに施用して、化学肥料の施用量は基準の2/3程度にする。
レンゲ 9月中旬~10月中旬に、10a当たり3kgを基準として播種する。
土壌改良資材の施用

Table with columns: 品種名, 肥料名, 基肥, 穂肥, 成分量, 品種名, 肥料名, 基肥, 穂肥, 成分量. Lists fertilizers for '夢つくし' and 'ヒノヒカリ'.

基肥が側条施肥の場合 肥料はベスト化成444を使用する。基肥量は10a当たり、夢つくしは25kg、元気つくし・ヒノヒカリは30kg、ツクシホマレは40kgとする。

Table with columns: 品種名, 肥料名, 基肥, 全層施肥の成分量, 品種名, 肥料名, 基肥, 全層施肥の成分量. Lists fertilizers for '夢つくし' and '元気つくし・ヒノヒカリ'.

※水稲管理日誌を必ず記帳しましょう。肥料・農薬の注文はJAへ!! この栽培暦は、JA米の生産基準を兼ねています。JA米とそれ以外を区分してJAに出荷しましょう。

除草 初期除草剤 除草剤名 使用時期 使用量(10a当り) 使用上の注意

Table with columns: 剤型, 除草剤名, 使用時期, 使用量(10a当り), 使用上の注意. Lists herbicides like 'ラオウ1キロ粒剤' and 'エンベラー1キロ粒剤'.

中後期除草剤 対象雑草 除草剤名 使用時期 使用量(10a当り) 使用上の注意

Table with columns: 対象雑草, 除草剤名, 使用時期, 使用量(10a当り), 使用上の注意. Lists herbicides like 'クリンチャー1キロ粒剤' and 'クリンチャーEW'.